소독제

청소	+	소독	=	안전한 표면
이물질 제거		*대부분의 세균 제거*		*다음 작업에 사용 가능*

세균 확산을 방지하려면 두 가지 단계 모두 수행해야 합니다.
청소만으로는 세균을 제거할 수 없으며, 청소 후에 소독제를 사용해야 효과적입니다.

일반적인 소독제 유형

염소 표백제

- **농도:**
  50~100ppm
- **접촉 시간:**
  10초
- **장점:**
  - 강력한 노로바이러스 제거 효과
  - 저렴한 비용
- **단점:**
  뜨거운 물, 직사광선, 과도한 이물질이 있는 경우 효과 감소

4차 암모늄 화합물

- **농도:**
  제조업체 지침에 따라 다름
- **접촉 시간:**
  최대 90초 이상
- **장점:**
  - 무취
  - 무독성
  - 잔여 막 형성
- **단점:**
  - 긴 접촉 시간 요구
  - 비용 부담

소독제 준비



유의 사항

- 모든 소독제와 화학물질은 식품 및 식품 접촉면에서 멀리 떨어진 곳에 보관합니다.
- 해당 구역에서 식품을 취급하기 전에 먼저 소독제를 준비합니다.
- 테스트 도구로 소독제 농도를 자주 확인하여 새로운 용액을 만들어야 할 시점을 파악합니다.
- 방수 커버로 완전히 덮어두지 않은 식품 주위에는 절대 소독제를 뿌리지 않습니다.
- 사용 중인 도구 표면은 최소 4시간마다 자주 청소하고 소독합니다.
- 소독제에 라벨을 붙이거나 빨간색 통에 보관합니다.

Southern Nevada Health District
280 S. DECATUR BLVD. • LAS VEGAS, NV 89107 • (702) 759-1110 • WWW.SNHD.INFO