



消毒劑



您需要兩個步驟加在一起才能防止細菌傳播。
單靠清潔無法殺菌，未先清潔而單靠殺菌劑也是沒有效果。

常見消毒液類型


消毒液設置

氯水/漂白劑

- 濃度: 50-100ppm
- 接觸時間: 10 秒
- 优点:
 - 對諾羅病毒有效
 - 便宜
- 缺點: 在熱水中、陽光直射和雜物過多的情況下會失去消毒效果

四級銨鹽 (QUAT)

- 濃度: 遵循製造商指示
- 接觸時間: 長達 90 秒或更長時間
- 优点:
 - 無味
 - 無毒
 - 留下殘留薄膜
- 缺點:
 - 接觸時間長
 - 成本高



謹記

- 將所有消毒液和化學品置於最下方，使其遠離食物和食物接觸面。
- 於所在區域開始處理食物前，請先妥善準備好消毒液。
- 經常使用測試紙確認消毒液的濃度，以便知道何時該準備新的消毒液。
- 如果食品沒有完全被隔水蓋住，切勿在食物附近噴灑消毒劑
- 經常將食物接觸表面清潔或消毒，使用中的器具和表面至少每 4 小時要清潔和消毒一次。
- 消毒液應該標識好或裝在紅色桶裏面。